

## Chapitre 11 : équations différentielles et systèmes différentiels

### I)EDL du premier ordre à coefficients constants

Déf : on appelle équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants toute équation différentielle du type :

$$(E) : \quad y' + ay = b(t)$$

où  $a$  est une constante réelle et  $b$  une fonction continue sur  $I \subset \mathbf{R}$ .

On appelle solution de  $(E)$  toute fonction  $y$  dérivable sur  $I$  telle que

$$\forall t \in I, \quad y'(t) + ay(t) = b(t).$$

Déf : on appelle équation différentielle homogène associée à  $(E)$  l'équation différentielle :

$$(E_0) : \quad y' + ay = 0.$$

#### THM1 (fondamental)

L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de  $(E_0)$  sur  $\mathbf{R}$  est :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ t \mapsto \beta e^{-at}, \beta \in \mathbf{R} \right\}.$$

Remarque

$\mathcal{S}_0$  est un espace vectoriel de dimension 1.

#### THM2(forme des solutions)

1)L'équation différentielle  $(E)$  admet au moins une solution.

2)Soit  $y_p$ , une solution particulière de  $(E)$ .

L'ensemble  $\mathcal{S}$  des solutions de  $(E)$  est de la forme :

$$\mathcal{S} = \{y_0 + y_p, \quad y_0 \in \mathcal{S}_0\}$$

#### Exercice 1

Résoudre l'équation différentielle  $y' + 3y = 6t$  sur  $\mathbf{R}$ .

réponse :  $\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \beta e^{-3t} + 2t - \frac{2}{3}, \quad \beta \in \mathbf{R} \right\}.$

#### Exercice 2

Résoudre l'équation différentielle  $y' = 2y + e^t$  sur  $\mathbf{R}$ .

réponse :  $\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \beta e^{2t} - e^t, \quad \beta \in \mathbf{R} \right\}.$

#### P1 (principe de superposition)

Soient  $a$  une constante réelle,  $b_1$  et  $b_2$  deux fonctions continues sur  $I$ .

Soit  $y_1$  une solution de l'équation différentielle  $y' + ay = b_1(t)$ .

Soit  $y_2$  une solution de l'équation différentielle  $y' + ay = b_2(t)$ .

Alors,  $y_1 + y_2$  est solution de l'équation différentielle  $y' + ay = b_1(t) + b_2(t)$ .

#### Exercice 3

Trouver une solution particulière de l'équation différentielle  $y' - 2y = e^{-t} + 1$ .

réponse :  $t \mapsto -\frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{2}$ .

## II)EDL du second ordre à coefficients constants

Déf : on appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants toute équation différentielle du type :

$$(E) : \quad y'' + ay' + by = c(t)$$

où  $a$  et  $b$  sont des constantes réelles,  $c$  une fonction continue sur  $I \subset \mathbf{R}$ .

On appelle solution de  $(E)$  toute fonction  $y$  deux fois dérivable sur  $I$  telle que

$$\forall t \in I, \quad y''(t) + ay'(t) + by(t) = c(t).$$

Déf : on appelle équation différentielle homogène associée à  $(E)$  l'équation différentielle :

$$(E_0) : \quad y'' + ay' + by = 0.$$

### THM3

Soit  $\mathcal{S}_0$  l'ensemble des solutions de  $(E_0)$  sur  $\mathbf{R}$ .

Soit  $\Delta$  le discriminant de l'équation caractéristique :  $r^2 + ar + b = 0 \quad (*)$

1) si  $\Delta > 0$  :

$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto \beta_1 e^{r_1 t} + \beta_2 e^{r_2 t}, (\beta_1, \beta_2) \in \mathbf{R}^2\}$  où  $r_1$  et  $r_2$  sont les solutions de  $(*)$ .

2) si  $\Delta = 0$  :

$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto (\beta_1 t + \beta_2) e^{r_0 t}, (\beta_1, \beta_2) \in \mathbf{R}^2\}$  où  $r_0$  est la racine double de  $(*)$ .

Remarque

$\mathcal{S}_0$  est un espace vectoriel de dimension 2.

### THM4 (forme des solutions)

1) L'équation différentielle  $(E)$  admet au moins une solution.

2) Soit  $y_p$ , une solution particulière de  $(E)$ .

L'ensemble  $\mathcal{S}$  des solutions de  $(E)$  est de la forme :

$$\mathcal{S} = \{y_0 + y_p, \quad y_0 \in \mathcal{S}_0\}$$

### Exercice 4

Résoudre l'équation différentielle  $y'' + 4y' + 3y = 6$  sur  $\mathbf{R}$ .

Réponse :  $\mathcal{S} = \{t \mapsto \beta_1 e^{-t} + \beta_2 e^{-3t} + 2, \quad (\beta_1, \beta_2) \in \mathbf{R}^2\}$ .

### Exercice 5

Résoudre l'équation différentielle  $y'' - 2y' + y = t^2$  sur  $\mathbf{R}$ .

Réponse :  $\mathcal{S} = \{t \mapsto (\beta_1 t + \beta_2) e^t + t^2 + 4t + 6, \quad (\beta_1, \beta_2) \in \mathbf{R}^2\}$ .

### P2 (principe de superposition)

Soient  $a$  et  $b$  des constantes réelles,  $c_1$  et  $c_2$  deux fonctions continues sur  $I$ .

Soit  $y_1$  une solution de l'équation différentielle  $y'' + ay' + by = c_1(t)$ .

Soit  $y_2$  une solution de l'équation différentielle  $y'' + ay' + by = c_2(t)$ .

Alors,  $y_1 + y_2$  est solution de l'équation différentielle  $y'' + ay' + by = c_1(t) + c_2(t)$ .

### Exercice 6

Trouver une solution particulière de l'équation différentielle  $y'' - y = t + e^{2t}$ .

Réponse :  $t \mapsto -t + \frac{1}{3}e^{2t}$ .

### III) Trajectoires, points d'équilibre d'une équation différentielle

Dans tout le paragraphe,  $(E)$  désigne une équation différentielle sur  $I$ .

Déf : on appelle trajectoire de  $(E)$  tout ensemble  $\{(t, y(t)), t \in I\}$  où  $y$  est une solution de  $(E)$ .

Graphiquement, une trajectoire est la courbe représentative d'une solution de  $(E)$ .

Déf : on dit qu'une constante réelle  $c$  est un point d'équilibre de  $(E)$  si la fonction  $t \mapsto c$  est solution de  $(E)$ .

Déf : on dit qu'une trajectoire  $\{(t, y(t)), t \in I\}$  de  $(E)$  converge si  $y(t)$  admet une limite finie quand  $t \rightarrow +\infty$ .

Remarque

Il n'y a pas toujours de point d'équilibre.

Exemple :  $y' + y = t$ .

#### Exercice 7

Soit l'équation différentielle  $(E)$  :  $y' + y = 1$ .

1) Trouver les points d'équilibre de  $(E)$ .

2) Résoudre  $(E)$ .

3) Donner l'allure des trajectoires de  $(E)$ .

### IV) Systèmes différentiels

Déf : un système différentiel est un système de la forme

$$(S) \left\{ \begin{array}{lcl} x'_1 & = & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ . & & . \\ . & & . \\ x'_n & = & a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{array} \right.$$

avec les conventions suivantes :

– les coefficients  $a_{ij}$  ( $1 \leq i \leq n$  et  $1 \leq j \leq n$ ) sont des constantes réelles,

–  $x_1, \dots, x_n$  sont des fonctions dérivables de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$ .

Def : résoudre le système différentiel  $(S)$ , c'est trouver les fonctions  $x_1, \dots, x_n$  dérivables sur  $\mathbf{R}$  et vérifiant pour tout  $t \in \mathbf{R}$  :

$$\left\{ \begin{array}{lcl} x'_1(t) & = & a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \cdots + a_{1n}x_n(t) \\ . & & . \\ . & & . \\ x'_n(t) & = & a_{n1}x_1(t) + a_{n2}x_2(t) + \cdots + a_{nn}x_n(t) \end{array} \right.$$

Au concours, on a en général  $n = 2$  ou  $n = 3$ . On utilise alors les lettres  $x, y, z$  plutôt que  $x_1, x_2, x_3$ .

#### Exercice 8 (système diagonal)

Résoudre le système différentiel  $(S)$   $\left\{ \begin{array}{lcl} x' & = & 2x \\ y' & = & -4y \end{array} \right.$

Réponse :  $x : t \mapsto \beta e^{2t}$  et  $y : t \mapsto \gamma e^{-4t}$ , avec  $(\beta, \gamma) \in \mathbf{R}^2$ .

### Exercice 9 (système triangulaire)

Résoudre le système différentiel  $(S)$   $\begin{cases} x' = 3x + 2y \\ y' = -y \end{cases}$

Réponse :  $x : t \mapsto -\frac{\beta}{2}e^{-t} + \gamma e^{3t}$  et  $y : t \mapsto \beta e^{-t}$  avec  $(\beta, \gamma) \in \mathbf{R}^2$ .

### P3 (écriture matricielle d'un système différentiel - important)

Tout système différentiel peut s'écrire sous la forme matricielle :

$$X' = AX.$$

$$\text{où } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & & & a_{nn} \\ a_{n1} & & & & \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x'_n \end{pmatrix}.$$

Remarque

$X$  est une fonction vectorielle, c'est-à-dire un vecteur colonne dont les composantes sont des fonctions.

Exemple :

$$(S) \begin{cases} x' = 2x + 3y \\ y' = 5x - 4y \end{cases} \text{ s'écrit matriciellement sous la forme } X' = AX, \\ \text{avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

### P4 (solution particulière)

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ .

Soient  $\lambda$  une valeur propre de  $A$  et  $V$  un vecteur propre de  $A$  associé à  $\lambda$ .

Soit  $(S)$  un système différentiel d'écriture matricielle  $X' = AX$  (\*)

Alors, la fonction vectorielle  $t \mapsto e^{\lambda t}V$  est une solution (particulière) de (\*).

### Exercice 10

Trouver une solution du système différentiel  $(S)$   $\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$

Réponse : le système différentiel s'écrit  $X' = AX$  avec  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

2 est valeur propre de  $A$ . Un vecteur propre de  $A$  associé à 2 est  $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

Une solution de  $(S)$  est donc  $t \mapsto (e^{2t}, -e^{2t})$ . Il y en a d'autres ...

### THM5 (résolution pratique des systèmes différentiels)

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  une matrice diagonalisable.

Soit  $(S)$  un système différentiel d'écriture matricielle  $X' = AX$  (\*)

Soit  $(V_1, \dots, V_n)$  une base de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$  formée de vecteurs propres de  $A$  et soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  les valeurs propres correspondantes.

Les solutions de (\*) sont les fonctions vectorielles de la forme :

$$X : t \mapsto \beta_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + \dots + \beta_n e^{\lambda_n t} V_n$$

où  $\beta_1, \dots, \beta_n$  sont des constantes réelles quelconques.

**Exercice 11**

Soient  $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -4 \\ 3 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

On considère le système différentiel :

$$(S) \begin{cases} x' = x + 4y - 4z \\ y' = 3x + 2y - 4z \\ z' = 3x - 3y + z \end{cases}$$

- 1) Mq  $(V_1, V_2, V_3)$  est une base de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbf{R})$  formée de vecteurs propres de  $A$ .
- 2)a)Vérifier que  $(S)$  s'écrit sous forme matricielle :  $X' = AX$  (\*)
- b) Trouver toutes les fonctions vectorielles  $X$  solutions de (\*).
- c) Résoudre  $(S)$ .
- 3) Déterminer l'unique solution  $(f, g, h)$  de  $(S)$  telle que  $f(0) = 1$ ,  $g(0) = 2$  et  $h(0) = 3$ .

Réponse

- 1) Les valeurs propres de  $A$  associées à  $V_1$ ,  $V_2$  et  $V_3$  sont 1, -2 et 5.
- 2)b) Les solutions de (\*) sont les fonctions vectorielles

$$X : t \mapsto \beta_1 e^t V_1 + \beta_2 e^{-2t} V_2 + \beta_3 e^{5t} V_3$$

où  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  et  $\beta_3$  sont des constantes réelles quelconques.

Ce sont donc les fonctions  $X : t \mapsto \begin{pmatrix} \beta_1 e^t + \beta_3 e^{5t} \\ \beta_1 e^t + \beta_2 e^{-2t} + \beta_3 e^{5t} \\ \beta_1 e^t + \beta_2 e^{-2t} \end{pmatrix}$ .

2)c) Les solutions de  $(S)$  sont les triplets de fonctions  $(x, y, z)$  avec :

$$x : t \mapsto \beta_1 e^t + \beta_3 e^{5t}, \quad y : t \mapsto \beta_1 e^t + \beta_2 e^{-2t} + \beta_3 e^{5t} \quad \text{et} \quad z : t \mapsto \beta_1 e^t + \beta_2 e^{-2t}.$$

$$3) \text{On résout le système } \begin{cases} \beta_1 + \beta_3 &= 1 \\ \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 &= 2 \\ \beta_1 + \beta_2 &= 3 \end{cases} \iff \begin{cases} \beta_1 &= 2 \\ \beta_2 &= 1 \\ \beta_3 &= -1 \end{cases}.$$

On a donc  $f : t \mapsto 2e^t - e^{5t}$ ,  $g : t \mapsto 2e^t + e^{-2t} - e^{5t}$  et  $h : t \mapsto 2e^t + e^{-2t}$ .

**P5 (existence et unicité de la solution - Cauchy)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  quelconque.

Soient  $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{R})$ . Soit  $t_0 \in \mathbf{R}$ .

Soit  $(S)$  un système différentiel d'écriture matricielle  $X' = AX$  (\*)

Alors, il existe une unique fonction vectorielle solution de (\*) et vérifiant la condition initiale  $X(t_0) = X_0$ .

## V) Trajectoires, points d'équilibre d'un système différentiel

Dans tout le paragraphe,  $(S)$  est un système différentiel d'écriture matricielle  $X' = AX$  avec  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$  et  $n \geq 2$ .

Déf : on appelle trajectoire de  $(S)$  tout ensemble  $\{(x_1(t), \dots, x_n(t)), t \in \mathbf{R}\}$  où  $(x_1, \dots, x_n)$  est solution de  $(S)$ .

Remarque

Une trajectoire est une courbe paramétrée du plan (quand  $n = 2$ ) ou de l'espace (quand  $n = 3$ ).

Déf : on dit qu'une trajectoire  $\{(x_1(t), \dots, x_n(t)), t \in \mathbf{R}\}$  converge si pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $x_i(t)$  admet une limite finie quand  $t \rightarrow +\infty$ .

En notant  $l_i = \lim_{t \rightarrow +\infty} x_i(t)$ , on dit alors que cette trajectoire converge vers  $(l_1, \dots, l_n)$ .

Dans le cas contraire, on dit que la trajectoire diverge.

Déf : soient  $c_1, \dots, c_n$  des constantes réelles.

On dit que  $(c_1, \dots, c_n)$  est un point d'équilibre si  $(c_1, \dots, c_n)$  est solution de  $(S)$ .

**P6**

$$(c_1, \dots, c_n) \text{ est un point d'équilibre de } (S) \iff \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in E_0(A).$$

En particulier,  $(0, \dots, 0)$  est toujours un point d'équilibre de  $(S)$ .

Déf : on dit que  $(c_1, \dots, c_n)$  est un point d'équilibre asymptotiquement stable si toute trajectoire converge vers ce point.

**P7**

Supposons  $A$  diagonalisable.

1) Si toutes les valeurs propres de  $A$  sont strictement négatives, alors toutes les trajectoires de  $(S)$  convergent vers le point d'équilibre  $(0, \dots, 0)$ .

$(0, \dots, 0)$  est donc asymptotiquement stable.

2) Si toutes les valeurs propres de  $A$  sont négatives ou nulles, alors toutes les trajectoires de  $(S)$  convergent vers un point d'équilibre (pas nécessairement le même).

3) Si l'une au moins des valeurs propres de  $A$  strictement positives, la plupart des trajectoires de  $(S)$  divergent.

Exercice 12

On considère le système différentiel

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} x' = x \\ y' = -2y \end{array} \right.$$

1) Résoudre  $(S)$ .

2) Déterminer l'unique point d'équilibre de  $(S)$ .

3) Tracer les trajectoires de  $(S)$ .

indication : commencer par dresser le tableau de variations des fonctions  $t \mapsto x(t)$  et  $t \mapsto y(t)$  solutions de  $(S)$ , en distinguant plusieurs cas.

4) Vérifier la véracité de P7.